

# CONDUITE EN CAS D'ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG

## DEFINITION

**Tout contact avec du sang**, un liquide biologique contenant du sang ou un liquide biologique non visiblement souillé de sang mais avec un risque potentiel (liquide pleural, sécrétions génitales...)

Ces **contacts accidentels** peuvent survenir par **piqûre**, **coupure** avec un objet souillé (seringue, scalpel...), **contact** sur une peau lésée ou encore par **projection** sur l'œil, la bouche ou le nez



## PREMIERS SOINS D'URGENCE

### Piqûre, blessure ou contact direct du liquide biologique sur peau lésée :

- Ne pas faire saigner
- Nettoyage immédiat de la zone cutanée lésée à l'eau et au savon (3 mn)
- Rinçage à l'eau courante
- Désinfecter par contact (compresse imbibée) au moins 5 minutes avec du soluté de *Dakin* ou de l'alcool à 70° ou à défaut (attention aux allergies) de la *Bétadine*



### Piqûre ou blessure au doigt :

- Tremper le doigt dans un récipient contenant du *Dakin* ou de l'alcool à 70° au moins 5 mn



### Projection sur muqueuses et yeux :

- Rincer abondamment au sérum physiologique ou à l'eau (au moins 5 minutes)

## DANS L'HEURE SUIVANTE

Consulter un **service d'urgence hospitalier** qui :

- 1) Evaluera le risque infectueux (VIH, VHB et VHC) selon la personne source, le type d'exposition et l'immunité de la personne exposée
- 2) Mettra en route un traitement post-exposition le plus tôt possible (efficacité maximale dans les 4 heures)



## DANS LES 24 HEURES

- 1) Informer votre collectivité et déclarer l'accident du travail
- 2) Informer le service de médecine préventive
- 3) Informer votre assistant / conseiller de prévention afin de réaliser l'analyse de l'accident
- 4) Suivre les recommandations du médecin pour votre suivi clinique et sérologique

